



PROTOCOLE DE RECHERCHE: FPI-2068-101
Cohorte A2

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
_____	3	56
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m²)
_____	_____	_____
Date résultat	Date résultat	Allergies
_____	_____	_____

Page 1 de 1

Sujet : _____

Calcul selon le poids de base.

Si changement de poids de plus ou égal à 10%: contacter le sponsor pour conduite à tenir

Chimiothérapie

Administrer le FPI-2053 au centre de chimiothérapie.

Le [²²⁵Ac]-FPI-2068 sera administré en médecine nucléaire environ 30 minutes à 2 heures après le FPI-2053.

FPI-2053 1 mg/kg = mg intraveineux

Jour 1

dans 100 mL de NaCl 0.9% sans PVC à perfuser en 60 minutes.

Perfuser avec une tubulure avec filtre.

Garder en observation 30 minutes.

Heure de préparation :

Heure début perfusion :

Heure fin perfusion :

Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-08-05 15:31

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

FPI-2068 cohorte A2

DOSSIER MÉDICAL