



**PROTOCOLE DE RECHERCHE: FPI-2068-101**  
**Cohorte A3**

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	3	56	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )	Allergies
Date résultat	Date résultat		

Page 1 de 1

# Sujet : \_\_\_\_\_

*Calcul selon le poids de base.*

*Si changement de poids de plus ou égal à 10%: contacter le sponsor pour conduite à tenir*

### **Chimiothérapie**

**Administrer le FPI-2053 au centre de chimiothérapie.**

**Le [<sup>225</sup>Ac]-FPI-2068 sera administré en médecine nucléaire environ 30 minutes à 2 heures après le FPI-2053.**

**FPI-2053** 3 mg/kg =  mg intraveineux

Jour 1

dans 100 mL de NaCl 0.9% sans PVC à perfuser en 60 minutes.

Perfuser avec une tubulure avec filtre.

Garder en observation 30 minutes.

**Heure de préparation :**

**Heure début perfusion :**

**Heure fin perfusion :**

### **Post-chimiothérapie**

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-08-05 15:35

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

FPI-2068 cohorte A3

DOSSIER MÉDICAL