

Tableau de substitution automatique pour les héparines de faible poids moléculaire à dose thérapeutique

DALTÉPARINE

Daltéparine 200 unités/kg SC DIE avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 46	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec une fiole de Daltéparine 10 000 unités/mL (Fiole de 1 mL)
46 à 56,9	Seringue préremplie de 10 000 unités SC DIE
57 à 68,9	Seringue préremplie de 12 500 unités SC DIE
69 à 82,9	Seringue préremplie de 15 000 unités SC DIE
83 à 99,9	Seringue préremplie de 18 000 unités SC DIE
100 à 150	Utiliser la posologie en fonction du poids du tableau 100 unités/kg SC BID

Daltéparine 100 unités/kg SC BID avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 46	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec une fiole de Daltéparine 10 000 unités/mL (Fiole de 1 mL)
46 à 53,9	Seringue préremplie de 5 000 unités SC BID
54 à 68,9	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec une fiole de Daltéparine 10 000 unités/mL (Fiole de 1 mL)
69 à 82,9	Seringue préremplie de 7 500 unités SC BID
83 à 99,9	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec une fiole de Daltéparine 10 000 unités/mL (Fiole de 1 mL)
100 à 109,9	Seringue préremplie de 10 000 unités SC BID
110 à 129,9	Seringue préremplie de 12 500 unités SC BID
130 à 150	Seringue préremplie de 15 000 unités SC BID

Daltéparine 150 unités/kg SC DIE avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 46	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec une fiole de Daltéparine 10 000 unités/mL (Fiole de 1 mL)
46 à 56,9	Seringue préremplie de 7 500 unités SC DIE
57 à 68,9	Seringue préremplie de 10 000 unités SC DIE
69 à 82,9	Seringue préremplie de 12 500 unités SC DIE
83 à 98,9	Seringue préremplie de 15 000 unités SC DIE
≥ 99	Seringue préremplie de 18 000 unités SC DIE

Tableau de substitution automatique pour les héparines de faible poids moléculaire à dose thérapeutique

TINZAPARINE

Tinzaparine 175 unités/kg SC DIE¹ avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 42	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec la fiole de Tinzaparine 20 000 unités/mL (Fiole de 2 mL).
42 à 50,9	Seringue préremplie de 8 000 unités SC DIE
51 à 62,9	Seringue préremplie de 10 000 unités SC DIE
63 à 74,9	Seringue préremplie de 12 000 unités SC DIE
75 à 85,9	Seringue préremplie de 14 000 unités SC DIE
86 à 97,9	Seringue préremplie de 16 000 unités SC DIE
98 à 109,9	Seringue préremplie de 18 000 unités SC DIE
110 à 150	Utiliser la posologie du tableau 86 unités/kg SC BID

Tinzaparine 86 unités/kg SC BID¹ avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 42	Utiliser la posologie 175 unités/kg SC DIE
42 à 109,9	
110 à 127,9	Seringue préremplie de 10 000 unités SC BID
128 à 150	Seringue préremplie de 12 000 unités SC BID ²

¹ Peu de données en obésité (Poids > 120 kg)

² Dose maximale selon le guide de l'Association des Pharmaciens des Établissements de Santé du Qc (APES)

Tableau de substitution automatique pour les héparines de faible poids moléculaire à dose thérapeutique

ÉNOXAPARINE

Énoxaparine 1.5 mg/kg SC DIE avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 36	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec la fiole d'Énoxaparine 100 mg/mL (Fiole de 3 mL)
36 à 42,9	Seringue préremplie de 60 mg SC DIE
43 à 50,9	Seringue de 70 mg SC DIE préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 30 mg et une seringue de 40 mg SC DIE. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.7mL dans la seringue préremplie de 100mg.
51 à 59,9	Seringue préremplie de 80 mg SC DIE
60 à 72,9	Seringue préremplie de 100 mg SC DIE
73 à 88,9	Seringue préremplie de 120 mg SC DIE
89 à 99,9	Seringue préremplie de 150 mg SC DIE
100 à 150	Utiliser la posologie du tableau 1 mg/kg SC BID

Énoxaparine 1 mg/kg SC BID avec fonction rénale normale > 30mL/min

Poids (kg)	Substitution
Moins de 36	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec la fiole d'Énoxaparine 100 mg/mL (Fiole de 3 mL)
36 à 44,9	Seringue préremplie de 40 mg SC BID
45 à 53,9	Seringue de 50 mg SC BID préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 20 mg et une seringue de 30 mg SC BID. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.5mL dans la seringue préremplie de 60mg.
54 à 65,9	Seringue préremplie de 60 mg SC BID
66 à 75,9	Seringue de 70 mg SC BID préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 30 mg et une seringue de 40 mg SC BID. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.7mL dans la seringue préremplie de 100mg.
76 à 87,9	Seringue préremplie de 80 mg SC BID
88 à 99,9	Seringue de 90 mg SC BID préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 30 mg et une seringue de 60 mg SC BID. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.9mL dans la seringue préremplie de 100mg.
100 à 109,9	Seringue préremplie de 100 mg SC BID
110 à 133,9	Seringue préremplie de 120 mg SC BID
134 à 150	Seringue préremplie de 150 mg SC BID

Énoxaparine 1 mg/kg SC DIE **si fonction rénale ≤ 30 mL/min**

Poids (kg)	Substitution
Moins de 36	Dose selon le poids réel : Seringue préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : si disponible, préparer la dose avec la fiole d'Énoxaparine 100 mg/mL (Fiole de 3 mL)
36 à 44,9	Seringue préremplie de 40 mg SC DIE
45 à 53,9	Seringue de 50 mg SC DIE préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 20 mg et une seringue de 30 mg SC DIE. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.5mL dans la seringue préremplie de 60mg.
54 à 65,9	Seringue préremplie de 60 mg SC DIE
66 à 75,9	Seringue de 70 mg SC DIE préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 30 mg et une seringue de 40 mg SC DIE. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.7mL dans la seringue préremplie de 100mg.
76 à 87,9	Seringue préremplie de 80 mg DIE
88 à 99,9	Seringue de 90 mg SC DIE préparée par la pharmacie Hors des heures d'ouverture : administrer une seringue de 30 mg et une seringue de 60 mg SC DIE. Si indisponible, possibilité d'ajuster à 0.9mL dans la seringue préremplie de 100mg.
100 à 109,9	Seringue préremplie de 100 mg SC DIE
110 à 133,9	Seringue préremplie de 120 mg SC DIE
134 à 150	Seringue préremplie de 150 mg SC DIE