



PROTOCOLE DE RECHERCHE : TROPION Breast
04 - Groupe expérimental : Datopotamab
deruxtecan + Durvalumab

Cancer du sein triple négatif

Néo-adjuvant

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
8		21	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)	Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 1 de 2

Jours d'administration planifiés

Jour 1

Sujet : _____

Pre-chimiothérapie

Acétaminophène 650 mg orale
60 minutes pré-chimiothérapie

DiphenhydrAMINE 25 mg orale
60 minutes pré-chimiothérapie

Ondansétron 16 mg orale
30 min pré-chimiothérapie

Dexaméthasone 12 mg orale
30 min pré-chimiothérapie

Chimiothérapie

Datopotamab DERUXTECAN 6 mg/kg = mg intraveineux

Jour 1

dans 250 mL de D5% via une tubulure avec filtre. **Protéger de la lumière**

1^{ère} dose: Donner en 90 minutes. Garder en observation 60 minutes.

2^e dose: Donner en 30 minutes. Garder en observation 60 minutes.

3^e dose et +: Donner en 30 minutes. Garder en observation 30 minutes.

Heure de préparation :

Heure début perfusion :

Heure fin perfusion :

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-03-29 18:25

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

TROPION Dato-DXd+Durva

DOSSIER MÉDICAL



PROTOCOLE DE RECHERCHE : TROPION Breast
04 - Groupe expérimental : Datopotamab
deruxtecan + Durvalumab

Cancer du sein triple négatif

Néo-adjuvant

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
8		21	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)	Allergies

Page 2 de 2

Chimiothérapie

Durvalumab [1120] mg intraveineux

Jour 1

dans 100 mL de NaCl 0.9% en 60 minutes.

Perfuser avec une tubulure avec filtre.

Observation de 60 minutes après la première perfusion

Heure de préparation :

Heure début perfusion :

Heure fin perfusion :

Post-chimiothérapie

Dexaméthasone 8 mg orale

une fois par jour pour 2 jours. Débuter le lendemain de la chimiothérapie.

Prochlopréazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Carboxyméthycellulose (Refresh Celluvisc) 1 goutte(s) ophtalmique

En continu

Appliquer une goutte dans chaque œil 4 fois par jour

Possibilité d'augmenter jusqu'à 8 fois par jour si besoin

Dexamethasone 0.1 mg/mL 10 mL orale

Utiliser 10 mL en gargarisme pendant 2 minutes qid (ne pas avaler)

Ne rien prendre par la bouche pendant une heure après le gargarisme

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-03-29 18:25