



5-azaCITIDine - Vénétoclax (Cycle 1)

Leucémie myéloïde aiguë

Pont à la greffe

Cycle	Nombre de cycles		Durée (jours)
	1		28
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m²)	Allergies
Date résultat	Date résultat		

Page 1 de 1

Jours d'administration planifiés

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6
Jour 7					

Pre-chimiothérapie

Ondansétron 8 mg orale
Jours 1 à 7
30 min pré-chimiothérapie

Chimiothérapie

5-azaCITIDine 75 mg/m² = mg sous-cutanée
Jours 1 à 7

Vénétoclax mg orale
Jour 1

Vénétoclax mg orale
Jour 2

Vénétoclax mg orale
Jour 3

Vénétoclax mg orale
En continu
DIE à partir du Jour 4 (dose ajustée en raison de l'interaction avec le posaconazole)

Post-chimiothérapie

Posaconazole 300 mg orale
deux fois par jour au Jour 4, puis une fois par jour par la suite
Prochlorpérazine 10 mg orale
aux 4 à 6 heures si besoin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-05-14 09:12

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Vidaza - Vénétoclax (C1)

DOSSIER MÉDICAL