



BEP

### Cancer des testicules

1ère ligne

Cycle

Nombre de cycles  
Indéterminé

Durée (jours)  
21

Taille (cm)

Poids (kg)

Surface (m<sup>2</sup>)

Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 1 de 3

### Jours d'administration planifiés

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 9

Jour 16

### Jours #1 à 5

#### Prérequis

##### Au jour 1:

Si neutrophiles supérieurs ou égal à 1: administrer traitement.

Si neutrophiles inférieurs à 1: administrer traitement avec 100% doses.

Contrôle FSC au jour #5, si neutrophiles demeurent inférieurs à 1 : débuter filgrastim.

##### Aux jours 9 et 16:

Donner sans égard aux résultats de la FSC

#### Pre-chimiothérapie

NaCl 0.9% avec 2g/L de MgSO<sub>4</sub> et 20 mEq/L de KCl 1000 mL intraveineux  
à 333 mL/h X 3h pré-chimiothérapie

Aprépitant 125 mg orale

Jour 1

60 minutes pré-chimiothérapie

Aprépitant 80 mg orale

Jours 2 à 5

60 minutes pré-chimiothérapie

Ondansétron 24 mg orale

Jours 1 à 5

30 min pré-chimiothérapie

Dexaméthasone 12 mg orale

Jours 1 à 5

30 min pré-chimiothérapie

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2023-05-17 13:41



BEP

### Cancer des testicules

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	Indéterminé	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
		Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 2 de 3

### Jours #1 à 5 (suite)

#### Chimiothérapie

**ATTENTION : La diurèse doit être de 100 mL/h ou plus pour initier la chimiothérapie.**

**Si diurèse inférieure à 100 mL/h :** administrer 250 mL NaCl 0,9% intraveineux à perfuser en 20 minutes

**Si diurèse toujours inférieure à 100 mL/h :** contacter le médecin pour directives

**CISplatin** 20 mg/m<sup>2</sup> =  mg intraveineux

Jours 1 à 5

une fois par jour dans 100-250 mL de NaCl 0.9% à perfuser à 1 mg/min

**Étoposide** 100 mg/m<sup>2</sup> =  mg intraveineux

Jours 1 à 5

une fois par jour dans 500-1000 mL de NaCl 0.9% sans PVC

Perfuser en 1 à 2\* heures via tubulure avec filtre.

\* Étoposide en 2h si dans 1000 mL

**Bléomycine**  30 unités intraveineux

Jour 2

dans 50 mL de NaCl 0.9% en 15 à 20 min

#### Post-chimiothérapie

NaCl 0.9% avec 20 mEq/L de KCl 1000 mL intraveineux

à 333 mL/h X 3h post-chimiothérapie

Dexaméthasone 8 mg orale

une fois par jour pour 2 jours. Débuter le jour 6.

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2023-05-17 13:41



BEP

### Cancer des testicules

1ère ligne

Cycle

	Nombre de cycles	Durée (jours)
	Indéterminé	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
		Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 3 de 3

### Jours #9 et #16

#### Prérequis

Administrer le traitement peu importe le résultat de la FSC, s'il y a lieu

#### Chimiothérapie

Bléomycine **[30]** unités intraveineux

Jour 9, Jour 16

dans 50 mL de NaCl 0.9% en 15 à 20 min

#### Post-chimiothérapie

Filgrastim \_\_\_\_\_ mcg sous-cutanée

Jours 7 et 8, Jours 10 à 12

une fois par jour. Omettre les jours de bléomycine.

**Débuter si** neutrophiles inférieurs à 1 pré-traitement **ET** au jour #5 du même cycle.

Références du protocole: J Clin Oncol. 1998 Apr;16(4):1287-93.

N Engl J Med. 1987 Jun 4;316(23):1435-40.

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2023-05-17 13:41

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

BEP

DOSSIER MÉDICAL