





**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras  
A : Odrонextamab [Cycle 3-4]**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	4	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
Allergies		

Date résultatat

Date résultatat

Page 2 de 6

## Jour 1 (suite)

### Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale  
aux 4 à 6 heures si besoin

NaCl 0,9% 1000 mL intraveineux

à 100 ml/h ad nouvel ordre.

Allopurinol 300 mg orale

une fois par jour

Si acide urique > 476 umol/L pré-traitement

Rasburicase 3 mg intraveineux

pour une dose

Trimétoprim / Sulfaméthoxazole 1 comprimé(s) orale

trois fois par semaine (comprimé DS = 160 mg / 800 mg)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Valacyclovir 500 mg orale

En continu

deux fois par jour

(Si Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min : 500 mg PO une fois par jour)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-24 16:32



**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras  
A : Odrонextamab [Cycle 3-4]**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

	Nombre de cycles	Durée (jours)
	4	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
Allergies		

Date résultat

Date résultat

Page 3 de 6

## Jour 8

**Si syndrome de relargage des cytokines ou neurotoxicité, se référer aux ordonnances médicales et pharmaceutiques de gestion des effets indésirables des anticorps bispécifiques (numéro OPI-CN-006) et (numéro OPI-CN-007)**

# Sujet : \_\_\_\_\_

### Pre-chimiothérapie

Si absence de réaction au Cycle 1 (titration) et au Cycle 2 Jour 1 et Jour 8,  
possibilité de cesser la pré-médication:

- Acétaminophène 650 mg orale  
30 à 60 minutes pré-traitement
- DiphenhydrAMINE 25 mg orale  
30 à 60 minutes pré-traitement (peut être utilisé IV)
- Dexaméthasone 10 mg intraveineux  
1 heure à 3 heures pré-traitement

### Chimiothérapie

**Odrонextamab** **80** mg intraveineux

Jour 8

Dans 100 mL de NaCl 0.9% à perfuser en 1 heure

Perfuser avec une tubulure avec filtre.

\*\*\* Garder en observation 1 heure \*\*\*

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-24 16:32

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 Odrонext C3-4

DOSSIER MÉDICAL



**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras  
A : Odrонextamab [Cycle 3-4]**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	4	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
Allergies		

Date résultatat

Date résultatat

Page 4 de 6

## Jour 8 (suite)

### Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale  
aux 4 à 6 heures si besoin

NaCl 0,9% 1000 mL intraveineux  
à 100 ml/h ad nouvel ordre.

Allopurinol 300 mg orale  
une fois par jour

Si acide urique > 476 umol/L pré-traitement

Rasburicase 3 mg intraveineux  
pour une dose

Trimétoprim / Sulfaméthoxazole 1 comprimé(s) orale  
trois fois par semaine (comprimé DS = 160 mg / 800 mg)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Valacyclovir 500 mg orale

En continu

deux fois par jour

(Si Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min : 500 mg PO une fois par jour)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-24 16:32



**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras  
A : Odrонextamab [Cycle 3-4]**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	4	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
Allergies		

Date résultat

Date résultat

Page 5 de 6

## Jour 15

**Si syndrome de relargage des cytokines ou neurotoxicité, se référer aux ordonnances médicales et pharmaceutiques de gestion des effets indésirables des anticorps bispécifiques (numéro OPI-CN-006) et (numéro OPI-CN-007)**

# Sujet : \_\_\_\_\_

### Pre-chimiothérapie

Si absence de réaction au Cycle 1 (titration) et au Cycle 2 Jour 1 et Jour 8,  
possibilité de cesser la pré-médication:

- Acétaminophène 650 mg orale  
30 à 60 minutes pré-traitement
- DiphenhydrAMINE 25 mg orale  
30 à 60 minutes pré-traitement (peut être utilisé IV)
- Dexaméthasone 10 mg intraveineux  
1 heure à 3 heures pré-traitement

### Chimiothérapie

**Odrонextamab** **[80]** mg intraveineux

Jour 15

Dans 100 mL de NaCl 0.9% à perfuser en 1 heure

Perfuser avec une tubulure avec filtre.

\*\*\* Garder en observation 1 heure \*\*\*

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-24 16:32

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 Odrонext C3-4

DOSSIER MÉDICAL



**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras  
A : Odrонextamab [Cycle 3-4]**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	4	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )
Allergies		

Date résultatat

Date résultatat

Page 6 de 6

## Jour 15 (suite)

### Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale  
aux 4 à 6 heures si besoin

NaCl 0,9% 1000 mL intraveineux

à 100 ml/h ad nouvel ordre.

Allopurinol 300 mg orale

une fois par jour

Si acide urique > 476 umol/L pré-traitement

Rasburicase 3 mg intraveineux

pour une dose

Trimétoprim / Sulfaméthoxazole 1 comprimé(s) orale

trois fois par semaine (comprimé DS = 160 mg / 800 mg)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Valacyclovir 500 mg orale

En continu

deux fois par jour

(Si Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min : 500 mg PO une fois par jour)

Poursuivre jusqu'à 3 mois après la dernière dose d'Odrонextamab.

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-24 16:32