



## **PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras B R-Bendamustine**

**Lymphomes folliculaires et/ou indolents**

1ère ligne

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	6	28	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )	Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 1 de 2

### **Jours d'administration planifiés**

Jour 1

Jour 2

# Sujet : \_\_\_\_\_

### **Prérequis**

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.0

Plaquettes supérieur ou égal à 100

### **Pre-chimiothérapie**

Acétaminophène 650 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

DiphenhydrAMINE 25 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Dexaméthasone 12 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

ou

MéthylPREDNISolone 80 mg intraveineux

30 minutes avant le riTUXimab si risque élevé de réactions d'hypersensibilité

Ondansétron 16 mg orale

Jours 1 et 2

30 min pré-chimiothérapie

Dexaméthasone 12 mg orale

Jour 2

30 min pré-chimiothérapie

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:44

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-Benda

DOSSIER MÉDICAL



## PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras B R-Bendamustine

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	6	28	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )	Allergies

Date résultatat

Date résultatat

Page 2 de 2

### Chimiothérapie

**RITUXIMAB (Riximyo)** 375 mg/m<sup>2</sup> =  mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL NaCl 0.9%

Débits progressifs selon la FADM

**BENDAMUSTINE** 90 mg/m<sup>2</sup> =  mg intraveineux

Jours 1 et 2

dans 500 mL NaCl 0.9% en 30 minutes

### Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Allopurinol 300 mg orale  
une fois par jour

**Pour la durée de la chimiothérapie et jusqu'à 6 mois après le dernier cycle:**

Valacyclovir 500 mg orale

En continu

deux fois par jour. (Si Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min : 500 mg PO une fois par jour)

Trimétoprim / Sulfaméthoxazole 1 comprimé(s) orale

trois fois par semaine (comprimé DS = 160 mg / 800 mg)

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:44

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-Benda

DOSSIER MÉDICAL