



PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras B R-CHOP

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	6	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Allergies		

Date résultatat

Date résultatat

Page 1 de 3

Jours d'administration planifiés

Jour 1

Sujet : _____

Prérequis

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.5

Plaquettes supérieur ou égal à 100

Pre-chimiothérapie

Acétaminophène 650 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Diphenhydramine 25 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Prednisone 100 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Prendre médicament fourni au patient par pharmacie d'oncologie - recherche.

Ondansétron 16 mg orale

30 minutes avant le CHOP

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:37

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-CHOP

DOSSIER MÉDICAL



PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras B R-CHOP

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	6	21	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)	Allergies

Date résultat

Date résultat

Page 2 de 3

Chimiothérapie

RITUXimab (Riximyo) 375 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL NaCl 0.9%

Débits progressifs selon la FADM

VinCRIStine 1.4 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 50 mL de NaCl 0.9 % en 10 minutes (Dose max = 2 mg)

DOXOrubicine 50 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

direct en 5 à 10 minutes (DAVP ou DAVC) OU

dans 50-250 mL de NaCl 0.9% à administrer en 15 min (DAVC seulement)

Cyclophosphamide 750 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL de NaCl 0.9 % à perfuser en 30 à 60 minutes

PredniSONE mg orale

Jours 2 à 5

une fois par jour

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:37

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-CHOP

DOSSIER MÉDICAL



**PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras
B R-CHOP**

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	6	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Date résultat	Date résultat	Allergies

Page 3 de 3

Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale
aux 4 à 6 heures si besoin

Allopurinol 300 mg orale
une fois par jour

Filgrastim _____ mcg sous-cutanée
Jours 3 à 7
une fois par jour

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:37

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-CHOP

DOSSIER MÉDICAL