



PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 - Bras B Rituximab en maintenance

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

	Nombre de cycles	Durée (jours)
	12	56
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Date résultat	Date résultat	Allergies

Date résultat

Date résultat

Allergies

Page 1 de 1

Jours d'administration planifiés

Jour 1

Sujet : _____

Prérequis

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.5

Plaquettes supérieur ou égal à 100

Pre-chimiothérapie

Acétaminophène 650 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Diphenhydramine 25 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Hydrocortisone 100 mg intraveineux

30 minutes avant le riTUXimab.

ou

MéthylPREDNISolone 80 mg intraveineux

30 minutes avant le riTUXimab si risque élevé de réactions d'hypersensibilité

Chimiothérapie

RITUXIMAB (Riximyo) 375 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL NaCl 0.9%

Débits progressifs selon la FADM

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 14:23

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 Ritux maintien

DOSSIER MÉDICAL