



PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 : Bras B R-COP

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	6	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Date résultat		Date résultat

Page 1 de 2

Jours d'administration planifiés

Jour 1

Sujet : _____

Prérequis

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.5

Plaquettes supérieur ou égal à 100

Pre-chimiothérapie

Acétaminophène 650 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Diphenhydramine 25 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Répéter aux 4 heures pendant la perfusion.

Prednisone 100 mg orale

1 heure avant le riTUXimab.

Prendre médicament fourni au patient par pharmacie d'oncologie - recherche.

Ondansétron 8 mg orale

pré-COP

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:52

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-COP

DOSSIER MÉDICAL



PROTOCOLE DE RECHERCHE : Olympia-1 : Bras B R-COP

Lymphomes folliculaires et/ou indolents

1ère ligne

Cycle

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)
	6	21
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Allergies		

Date résultat

Date résultat

Page 2 de 2

Chimiothérapie

RITUXimab (Riximyo) 375 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL NaCl 0.9%

Débits progressifs selon la FADM

VinCRIStine 1.4 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 50 mL de NaCl 0.9 % en 10 minutes (Dose max = 2 mg)

Cyclophosphamide 750 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1

dans 250-500 mL de NaCl 0.9 % à perfuser en 30 à 60 minutes

PredniSONE mg orale

Jours 2 à 5

une fois par jour

Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Allopurinol 300 mg orale

une fois par jour

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-09-18 13:52

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

Olympia-1 R-COP

DOSSIER MÉDICAL