

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION

## CEFTOBIPROLE Q8H

### IV par pompe

**MÉDICAMENT :**

CEFTOBIPROLE (Zevtera<sup>MD</sup>)

**POSOLOGIE :**

IV aux 8 heures

**SOLUTÉ :**

NaCl 0,9%

**PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :**

Utiliser solution de ceftobiprole à 50 mg/ml\* (reconstituée avec eau stérile)

Ajouter le volume de médicament requis dans le soluté correspondant

Ordonnance		Fabrication		
Dose aux 8 h (mg)	Dose quotidienne (mg)	Volume de médicament (ml)	Format du soluté (ml)	
500	1500	30	500	

Enlever air du soluté

**DURÉE LIMITÉE D'UTILISATION :**

Pour concentration de 2-2,8 mg/ml\* : 5 jours au réfrigérateur ou 24 heures à température pièce.

**PROGRAMMATION :**

Dose aux 8 h (mg)	Volume résiduel (ml)	Volume de dose (ml)	Durée de dose (h)	Cycle de dose (h)	Débit MVO (ml/h)
500	565	180	2	8	0,5

\*1 mg de ceftobiprole = 1,33 mg de ceftobiprole médocaril

**RÉFÉRENCE :**

1. Cloutier I, Pilote S, Taillon I et coll. Ceftobiprole : étude de stabilité en sac de PVC pour usage en ambulatoire. Présentation des affiches, Grand Forum de l'APES. mars 2020. <https://www.grandforumapes.com/fr/grandforum2020/Affiches-scientifiques>