



Folfirinox (adjuvant)

Cancer du pancreas

Adjvant

Cycle

	Nombre de cycles	Durée (jours)
	12	14
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Date résultat	Date résultat	Allergies

Page 1 de 2

Jours d'administration planifiés

Jour 1

Prérequis

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.5

Plaquettes supérieur ou égal à 75

Pre-chimiothérapie

Aprépitant 125 mg orale

60 minutes pré-chimiothérapie

Ondansétron 24 mg orale

30 min pré-chimiothérapie

Dexaméthasone 12 mg orale

30 min pré-chimiothérapie

Atropine 0.4 mg sous-cutanée

au moment de débuter l'irinotécan si dose reçue lors du traitement précédent

(Aviser la pharmacie lorsqu'administré la première fois)

Chimiothérapie

Irinotécan 150 mg/m² = mg intraveineux

dans 500 mL de D5% en 90 min

Pendant la perfusion, garder au chevet : Atropine 0.4mg SC. Donner au besoin si sudation, crampes abdominales, diarrhée durant la perfusion et ad 1 heure suivant la fin de l'irinotécan (Max : 1.2 mg)

Oxaliplatin 85 mg/m² = mg intraveineux

dans 250-500 mL de D5% en 2 heures en dérivé de l'acide folinique

Acide folinique 400 mg/m² = mg intraveineux

dans 500 mL de D5% en 2 heures en dérivé de l'oxaliplatin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-12-09 15:14

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

FOLFIRINOX-adj

DOSSIER MÉDICAL



Folfirinox (adjvant)

Cancer du pancreas

Adjvant

Cycle

	Nombre de cycles	Durée (jours)
	12	14
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)
Allergies		

Date résultat

Date résultat

Page 2 de 2

Chimiothérapie

5-Fluorouracil 2400 mg/m² = mg intraveineux
à 5 mL/h pendant 46h via infuseur Intermate LV5

Post-chimiothérapie

Aprépitant 80 mg orale

le matin du jour 2 et le matin du jour 3.

Dexaméthasone 8 mg orale

le matin du jour 2 et le matin du jour 3.

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Lopéramide 4 mg orale

STAT si selle molle ou liquide, puis 2 mg au besoin

après chaque selle liquide subséquente

Si inefficace, débuter la posologie intensive:

Lopéramide 4 mg orale

STAT puis 2 mg aux 2 heures (ou 4 mg aux 4 heures la nuit) jusqu'à

l'arrêt complet de la diarrhée depuis au moins 12 heures

Filgrastim ____ mcg sous-cutanée

Jours 5 à 9

une fois par jour

Références du protocole: N Engl J Med 2018; 379:2395-2406

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2024-12-09 15:14

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

FOLFIRINOX-adj

DOSSIER MÉDICAL