



**PROTOCOLE DE RECHERCHE: BANTAM-1 (BAY  
22262) \*Partie 1\***

Carcinome hépatocellulaire

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	4	42	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m <sup>2</sup> )	Allergies

Page 1 de 1

### Jours d'administration planifiés

Jour 1

# Sujet : \_\_\_\_\_

**Administrer le BAY 3547922 au centre de chimiothérapie.**

(Le BAY 3547926 [anticorps chaud] sera administré en médecine nucléaire après le BAY 3547922.)

#### Prérequis

Neutrophiles supérieur ou égal à 1.0

Plaquettes supérieur ou égal à 75

#### Chimiothérapie

**BAY 3547922**  mg intraveineux

Jour 1

[En seringue] dans 5 mL de NaCl 0.9% à perfuser en 20 min.

Perfuser avec une tubulure avec filtre par pousse-seringue.

**\*\*\* Garder en observation 2 heures. \*\*\***

**\*\*\* Cette période d'observation sera faite en médecine nucléaire\*\*\***

**Heure de préparation :**

**Heure début perfusion :**

**Heure fin perfusion :**

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2025-03-26 10:45

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

BANTAM-1 \*Partie 1\*

DOSSIER MÉDICAL