





Rifaximine 20 mg/mL suspension orale

(Réf : 997-005-57 Date d'impression : 2025-06-09)



Temps de préparation estimé
de 20 à 60 minutes



Préparation de catégorie 1

Produits

Quantité

Rifaximine 550 mg comprimé	4 comp.
----------------------------	---------

Produit	Lot / Exp
---------	-----------

Ora-Blend ou Ora-Blend SF solution orale ¹	qs ad 110 mL
---	--------------

Produit	Lot / Exp
---------	-----------

Total :	110 mL
----------------	---------------

¹ Ora-Blend et Ora-Blend SF sont des mélanges 1:1 d'Ora-Plus et d'Ora-Sweet ou Ora-Sweet SF.

Note particulière

L'étude originale a été réalisée avec les comprimés (200 mg) de la compagnie Salix.

La dose de la préparation peut être mélangée dans un sirop au chocolat immédiatement avant l'administration afin d'en diminuer l'amertume.

Avant de commencer

- Lire et comprendre le protocole de préparation.
- Vérifier l'habillement et les protections requis par la norme applicable dans votre région pour ce type de préparation.
- Rassembler les ingrédients et le matériel.
- S'assurer de la propreté des équipements et de la surface de travail.
- Vérifier la date de péremption des ingrédients.

Rifaximine 20 mg/mL suspension orale

(Réf : 997-005-57 Date d'impression : 2025-06-09)

Stabilité

- Stable 60 jours à la température ambiante (15-25°C).

Les données de stabilité inscrites dans cette section sont basées sur la stabilité déterminée dans des conditions contrôlées en laboratoire rapportée dans les publications citées en référence, ou, en l'absence de telles données, sur les normes en vigueur. La stabilité en contexte d'utilisation réelle pourrait être plus courte.

Conseils particuliers pour le patient

- Bien agiter avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser si l'apparence, la couleur ou le goût du produit change.

Étiquette auxiliaire**Références**

Plusieurs références ont été consultées, principalement les suivantes :

- Cober, M. P., et al. (2010). "Stability of extemporaneously prepared rifaximin oral suspensions." *Am J Health Syst Pharm* 67(4): 287-289.
- Hôpital Ste-Justine - Pharmacie (2020-11). Rifaximine 20 mg/mL suspension orale. (<https://www.chusj.org/fr/soins-services/P/Pharmacie/Outils/Formulations-magistrales/Medicaments-et-formulations-magistrales> - Consulté le 2021-01-27)
- SickKids Pharmacy (2020-10). Rifaximin 20 mg/mL Oral Suspension. (<https://www.sickkids.ca/en/care-services/for-health-care-providers/compounding-service/> - Consulté le 2021-01-27)
- Ordre des Pharmaciens du Québec - Norme 2012.01 (janvier 2012) - Préparations magistrales non stériles en pharmacie.
- Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP) - Model Standards for Pharmacy Compounding of Non-sterile Preparations (2018)
- Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP) - Guidance Document for Pharmacy Compounding of Non-sterile Preparations (2018)
- Sigma-Aldrich - Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique - Rifaximine (Consultée le 2019-10-24 <http://www.sigmaldrich.com/canada-francais.html>)