

CEFTAZIDIME 12 g/jour perfusion I.V.

Sac de 12 heures (6 g en 12 heures); 2 sacs par jour

PRÉPARATION :

Peser sac : Si < 286 g : ne pas utiliser
Si 286-296 g : O.K. utiliser
Si > 296 g : retirer quantité (1 g = 1 ml) pour obtenir 296 g

Volume sac : 250 ml de NaCl 0.9%

Diluer fiole : 6 g avec 56 ml d'eau stérile
2 g avec 19 ml d'eau stérile
Conc. 100 mg/ml

Injecter : 60 ml

Concentration finale : 18.5 mg/ml

Enlever l'air :

CONSERVATION* :

Stabilité : Soluté T.P. : **(12 heures)**
T.R. : **9 jours** (14j)
Concentration : 1 – 30 mg/mL

PROGRAMMATION : 12 h

Volume total : 325 ml
En perfusion continue 25 mL/heure

Surplus 25 mL

* Références : - Trissel 2003
- AHFS Drugs Information 2000
- Drugdex
- Bing 2013
- Normes 2014 OPQ
- PGA # 16126

Révisé par : Marie-Josée Lachance 2019/06/26

7 mai 2024 ok codé dans pompe et dans Ariane DEV et prod mj

3 nov 2025 : volume modifié pour diminuer surplus. Pompe OK, manque Ariane (suivi #222)