

Pharmacie - PHAR-Général #166

Modifier les instructions automatiques pour la dexrazoxane

2024-02-02 13:44 - Gabrielle Ferland

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2024-04-25
Assigné à:	Marie-Josée Lachance		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:			
Description			
L'instruction automatique dans Ariane pour la dexrazoxane mentionne: Perfuser en 15 min. Administrer immédiatement AVANT la DOXOrubicine. Cependant, la dexrazoxane peut aussi être administrée avant d'autres anthracyclines, le plus souvent la daunorubicine. Est-ce possible de retirer l'instruction automatique et de pré-coder des instructions obligatoires à sélectionner dans le champ instruction à la saisie de l'ordonnance ? Soit: Administrer immédiatement AVANT la DOXOrubicine. OU Administrer immédiatement AVANT la Daunorubicine. Voir Gabrielle si pas clair. Merci.			

Historique

#1 - 2024-02-05 16:28 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-04-04 20:33 - Marie-Josée Lachance

- Assigné à mis à Marie-Josée Lachance

#3 - 2024-04-04 20:40 - Marie-Josée Lachance

[@Gabrielle Ferland](#) Est-ce qu'on pourrait mettre:
Administrer immédiatement AVANT l'anthracycline (ex DOXOrubicine, Daunorubicine) au mêmes endroits qu'actuellement soit pour nous quand on saisie et au choix du produit (en haut, ce qui est l'information pour l'infirmière) ?
le 15 minutes est ok?

#4 - 2024-04-09 18:58 - Marie-Josée Lachance

- Équipes Ariane supprimé

ok fait en DEV

#5 - 2024-04-09 19:59 - Mélanie Lacerte

- Echéance mis à 2024-04-25
- Statut changé de Accepté à Attente MEP

#6 - 2024-05-13 13:47 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu