

Pharmacie - PHAR-Général #196

Mucomyst en néonat

2024-04-15 18:52 - Camille Dufort-Rouleau

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-01-16
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Utilisation du mucomyst en PO et en IR en néonatalogie avec une solution diluée à 5%. Est-ce possible de l'ajouter dans Ariane? La dilution sera faite directement à l'étage selon la recette suivante :			
PO, IR : Dilution à 5% : 1 mL d'acétylcystéine 20% + 3 mL de NaCl0.9% ou d'eau stérile (total 4 mL).			
Aussi, pour la nébulisation : administration de la solution pure ou diluée avec 2 mL de NaCl0.9% (total 3 mL). Est-ce que ça vaut la peine de faire une entrée séparée vs ajout possible d'une instruction? Je vous laisse voir!			
Si besoin, la fiche a été mise à jour dans le partage de néo.			
Merci!!			

Historique

#1 - 2024-04-17 18:55 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-11-20 20:17 - Myriam Breton

- Assigné à mis à Myriam Breton

J'ai fait DEV mais je dois vérifier comment ça sort pour éviter confusion à l'étage avec les fioles non diluées.

À qui de droit, est-ce qu'on veut des voies alternatives à cette concentration.

Pour inhalation, je laisserais idem vu que c'est géré par inhalothérapeute. Est-ce ok?

#3 - 2024-11-20 20:17 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à En cours

#4 - 2024-11-20 20:52 - Camille Dufort-Rouleau

Seulement PO ou IR pour les voies.

Ok pour nébulisation !

#5 - 2024-12-05 21:20 - Myriam Breton

- Fichier clipboard-202412051619-oyim2.png ajouté

[@Cathy Desaulniers](#) Salut! Je voulais savoir si tu trouves ça assez clair à l'étage pour éviter la confusion avec les fioles non diluées!

Merci

Je n'Avais juste pas le temps d'investiguer la patante!

Tu peux le remettre au formulaire quand tu es prête

#12 - 2025-03-25 15:34 - Myriam Breton

- *Statut changé de Accepté à Résolu*

Fichiers

clipboard-202412051619-oyim2.png

187 ko

2024-12-05

Myriam Breton