

# Pharmacie - PHAR-Général #202

## Ajouter sémaglutide (Rybelsus) PO

2024-04-23 13:01 - Mélanie Lacerte

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	2024-06-06
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Myriam Breton		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	Ariane		
<b>Description</b>			
Sémaglutide (Rybelsus, Ozempic)	Sémaglutide 3mg/co Sémaglutide 7mg/co Sémaglutide 14mg/co Sémaglutide 4mg/3ml stylo inj Sémaglutide 2mg/1.5ml stylo inj		Au formulaire pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, en association avec la metformine lorsqu'une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace.
doit être pris à jeun, au moins 30 minutes avant le premier repas, la première boisson ou tout autre médicament oral de la journée. doit être pris avec un demi-verre d'eau tout au plus, soit l'équivalent de 120 mL. doit être avalé en entier. Ne pas fendre, écraser ou mâcher le comprimé. Ne pas prendre deux comprimés Rybelsus® pour obtenir une dose plus élevée.			

### Historique

#### #1 - 2024-05-29 19:28 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton
- Début mis à 2024-06-06

Fait DEV. Mis toutes ces instructions dans instructions de produit et j'ai aussi fait une ordonnance type avec 20 minutes avant déjeuner d'emblée. Sélection différente de Ozempic.

#### #2 - 2024-06-28 15:58 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu

### Fichiers

clipboard-202404230855-vjvsw.png	9,01 ko	2024-04-23	Mélanie Lacerte
----------------------------------	---------	------------	-----------------