

Pharmacie - PHAR-Général #497

Pantoprazole neonat

2025-04-10 18:42 - Cathy Desaulniers

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-06-12
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Pantoprazole adulte : se donne IV en 2 à 3 min Mais en néonat se donne sur 15min Donc soit créer une nouvelle entrée pour la néo ou nous permettre de changer le temps d'administration pour 15 min quand neo sans que le 2 à 3 min apparaisse dans les instructions.			

Historique

#1 - 2025-04-10 20:04 - Mélanie Lacerte

- Fichier clipboard-202504101603-wsnp2.png ajouté
- Statut changé de Nouveau à Accepté

Et en ped c'est un ou l'autre

MODE DE DILUTION	TEMPS D'ADMINISTRATION
COMPLÉTER AVEC ou DILUER DANS	
Seringue : aucune dilution	Seringue : IV en 2 minutes
Sac : ajout de la dose dans un mini-sac de 50 ml de diluant compatible	Sac : IV en 15 minutes sur pompe volumétrique

[@Cathy Desaulniers](#) est-ce ok dans le guide de néonat ? car je ne le vois pas dans Ariane 12B...

#2 - 2025-05-08 14:38 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à En cours
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV.

J'ai ajoutée une entrée pédiatrie et Néonat avec l'administration en 15 minutes en IV dérivé

[@Cathy Desaulniers](#) pour la néonat, ca ne dit pas le volume du soluté en IV dérivé (mais la fiche est en révision). Est-ce qu'on préfère donner en IV direct? est-ce que je crée une entrée IV direct néonat en 15 minutes (2 minutes en pédiatrie pour la même voie)?

#3 - 2025-05-08 14:38 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-06-12

#4 - 2025-07-11 16:55 - Cathy Desaulniers

Ne sera pas redilué la majorité du temps. Vont juste rediluer si le volume est trop petit. Donc IV en 15 min à 4mg/ml serait ok

#5 - 2025-07-11 17:28 - Myriam Breton

- Statut changé de En cours à Résolu

Dac. Fait DEV et PROD

Fichiers

clipboard-202504101603-wsnp2.png

24,5 ko

2025-04-10

Mélanie Lacerte