

Statut:	Attente MEP	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	2025-12-04
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		

Description

Cabotégavir sodique (Vocabria, Apretude)	Cabotégavir sodique 30 mg/ co Cabotégavir sodique 200 mg/ml	Au formulaire Apretude: Pour la prophylaxie préexposition au VIH-1
--	--	---

4.2 Posologie recommandée et ajustement posologique

Adultes, adolescents pesant ≥ 35 kg

Lorsqu’un traitement préliminaire par voie orale est prescrit, le traitement par APRETUDE comprend trois phases distinctes :

- une phase de traitement préliminaire par voie orale (comprimés APRETUDE),
- une phase d’injections initiales d’APRETUDE injectable (3 mL), et
- une phase d’injections subséquentes d’APRETUDE injectable (3 mL tous les deux mois).

La dose recommandée pour APRETUDE comprimés est d’un comprimé de 30 mg administré par voie orale une fois par jour avec ou sans nourriture.

Administration des injections intramusculaires

Injections initiales

Si le traitement préliminaire par voie orale est utilisé, les injections initiales doivent être administrées le dernier jour du traitement ou dans les trois jours suivants (voir le [tableau 1](#)). La dose initiale recommandée pour APRETUDE injectable est d’une injection intramusculaire unique de 3 mL (600 mg). Une deuxième injection intramusculaire de 3 mL (600 mg) doit être administrée un mois plus tard. Les personnes peuvent recevoir la deuxième injection initiale de 3 mL (600 mg) jusqu’à 7 jours avant ou après la visite d’injection prévue (voir le [tableau 1](#) ou le [tableau 2](#), selon le cas).

Injections subséquentes

Après la deuxième injection initiale, la dose recommandée pour les injections subséquentes d’APRETUDE injectable est d’une injection intramusculaire unique de 3 mL (600 mg) administrée tous les 2 mois. Les personnes peuvent recevoir APRETUDE injectable jusqu’à 7 jours avant ou après la visite d’injection prévue (voir le [tableau 1](#) ou le [tableau 2](#), selon le cas).

11 CONSERVATION, STABILITÉ ET MISE AU REBUT

Conserver APRETUDE comprimés à une température maximale de 30 °C.

Conserver APRETUDE injectable à une température de 30 °C ou moins dans la boîte d’origine. Ne pas congeler.

Suspension injectable

Si la boîte a été conservée au réfrigérateur, le flacon doit être ramené à la température ambiante avant l’administration (ne pas dépasser 30 °C).

Une fois que la suspension a été aspirée dans la seringue, l’injection doit être faite dès que possible, mais la suspension peut rester dans la seringue pendant une période maximale de 2 heures à température ambiante. La seringue remplie ne doit pas être placée dans le réfrigérateur. Si cette

Historique

#1 - 2025-11-10 19:38 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-12-04
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV

Fichiers

clipboard-202507221616-kgrdz.png	12,9 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte
clipboard-202507221618-4jcqa.png	42,4 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte
clipboard-202507221618-waa2d.png	12 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte
clipboard-202507221619-6cuyn.png	81,5 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte
clipboard-202507221621-ubvyw.png	22,6 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte
clipboard-202507221622-rg5m4.png	34,5 ko	2025-07-22	Mélanie Lacerte