

Pharmacie - PHAR-Général #624

Modifier le protocole de désensibilisation en oncologie

2025-09-10 18:48 - Brigitte Boilard

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|
| Statut: | Résolu | Début: | |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Thomas Joly-Mischlich | | |
| Catégorie: | | | |
| Version cible: | | | |
| Équipes: | Ariane | | |
| Description | | | |
| Discuté avec Thomas | | | |
| Modifier le protocole de désensibilisation en oncologie pour préciser le délai entre la pré-médication et la désensibilisation. | | | |
| Famotidine IV : 30 min avant le sac # 1 Cetirizine PO : 60 min avant le sac # 1 Dexamethasone IV : 30 min avant le sac # 1 | | | |
| Diphenhydramine IV : 30 min avant le sac # 3 AAS PO : 60 min avant le sac # 1 Montélukast PO : 60 min avant le sac # 1 | | | |
| Le fichier Excell de désensibilisation a été modifié | | | |
| @Thomas Joly-Mischlich | | | |

Historique

#1 - 2025-09-11 14:10 - Emile Bouchard

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Assigné à mis à Thomas Joly-Mischlich
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2025-09-11 19:47 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Accepté à Attente MEP

fait en DEV

#3 - 2025-09-25 17:14 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Attente MEP à Résolu