

ACTH néonate

2023-11-17 20:52 - Raphaël Coutu

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Joly-Mischlich		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		

Description
Demande C2 #2331533 (CDRouleau)

Codification Cortrosyn pour néonatalogie :

1) Doses de 12.5 mcg et moins : fiole de solution du SCAS - concentration finale de 5 mcg/mL, stable 12h TP.
- Administrer IV direct en 2 minutes
Recette (je ne sais pas si c'est utile, mais au cas où!) :
- Prélever 0.1 mL de cosyntrophine (25 mcg) et ajouter 4.9 mL de NS (concentration finale de 5 mcg/mL).
- Prélever la dose prescrite dans une seringue

2) Doses de plus de 12.5 mcg : fiole chariot
- Dilution de la fiole avec 1 mL de NaCl 0.9% (concentration à 250 mcg/mL (0.25 mg/mL))
- Prélever la quantité en mL de la fiole correspondant à la dose prescrite
- Ajouter du NaCl 0.9% pour un total (Cortrosyn + NaCl 0.9%) de 2 mL
- Administrer IV direct en 2 minutes

Si questions, faites-moi signe

Merci :)

Historique

#1 - 2023-11-23 15:26 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Accepté à Résolu
- Assigné à mis à Thomas Joly-Mischlich

Fait dans DEV ce jour. PTD modifiées.